


上海茁彩生物科技有限公司
Shanghai zcibio technology Co.,Ltd.



生化检测原理示意图

线粒体复合体 V 试剂盒说明书

分光光度法

注意：正式测定之前选择2-3个预期差异大的样本做预测定。

测定意义

线粒体复合体 V 又称F₁F₀-ATP合酶，广泛存在于动物、植物、微生物和培养细胞的线粒体中，由F₁和F₀两个亚单位组成。该酶利用呼吸链产生的质子电化学梯度催化ATP合成，也可逆过程水解ATP。此外，复合体 V 还存在于叶绿体、异养菌和光合细菌中。复合体 V 是线粒体氧化磷酸化和叶绿体光合磷酸化合成ATP的关键酶。

测定原理

复合体 V 水解 ATP 产生 ADP 和 Pi，通过测定 Pi 增加速率来测定复合体 V 活性。

需自备的仪器和用品

可见分光光度计、台式离心机、水浴锅、可调式移液器、1mL玻璃比色皿、研钵、冰和蒸馏水。

试剂的组成和配制：

种类	试剂规格	储存条件	使用方法及注意事项
试剂一	25mL×1 瓶	-20℃保存	
试剂二	25mL×1 瓶	-20℃保存	
试剂三	1 mL×1 瓶	-20℃保存	
试剂四	粉剂 ×1 支	-20℃保存	临用前每支加入1.3mL 蒸馏水，充分溶解备用，用不完的试剂仍-20℃保存
试剂五	6mL×1 瓶	4℃保存	
试剂六	粉剂×1瓶	4℃保存	临用前加入 3mL 蒸馏水，充分混匀； 溶解后 4℃保存一周
试剂七	粉剂×1瓶	4℃保存	临用前加入10mL 蒸馏水，充分混匀； 溶解后4℃保存一周
试剂八	粉剂×1瓶	4℃保存	临用前加入 10mL 蒸馏水，充分混匀
试剂九	液体 10mL×1 瓶	室温保存	

定磷试剂的配制：按 H₂O：试剂七：试剂八：试剂九=2:1:1:1 的比例配制，配好的定磷试剂应为浅黄色。若无色则试剂失效，若是蓝色则为磷污染（请根据需要，用多少配多少）

注意：配试剂最好用新的烧杯、玻棒和玻璃移液器，或者一次性塑料器皿，以避免磷污染

样本的前处理:

组织、细菌或细胞中胞浆蛋白与线粒体蛋白的分离:

- ① 准确称取 0.1g 组织或收集 500 万细菌或细胞, 加入 1mL 试剂一和 10uL 试剂三, 用冰浴匀浆器或研钵匀浆。
- ② 将匀浆 600g, 4°C 离心 5min。
- ③ 弃沉淀, 将上清液移至另一离心管中, 11000g, 4°C 离心 10min。
- ④ 上清液即为除去线粒体的胞浆蛋白, 可用于测定从线粒体泄漏的复合体 V (此步可选做)。
- ⑤ 步骤④中的沉淀即为线粒体, 加入 800uL 试剂二和 8uL 试剂三, 超声波破碎(冰浴, 功率 20% 或 200W, 超声 3s, 间隔 10 秒, 重复 30 次), 用于复合体 V 酶活性测定。

测定步骤

1、酶促反应

试剂名称 (μL)	对照管	测定管
试剂四	25	25
试剂五	100	100
样本		125

混匀, 37°C (哺乳动物) 或 25°C (其它物种) 准确水浴 30min

试剂六	50	50
样本	125	

混匀, 4000g, 25°C 离心 10min, 取上清液

2、定磷

上清液	170	170
定磷试剂	830	830

混匀, 室温静置 10min 左右, 在 660nm 处读取 A 测定管和 A 对照管, 计算 $\Delta A = A_{\text{测定管}} - A_{\text{对照管}}$ 。

复合体 V 活性计算

标准条件下测定的回归方程为 $y = 1.274x + 0.004$; x 为标准品浓度 (mmol/L), y 为 A 值。

1、组织中复合体 V 活性的计算:

(1) 按样本蛋白浓度计算

单位的定义: 每 mg 组织蛋白每分钟产生 1 nmol 无机磷定义为一个酶活性单位。

$$\text{复合体 V 活性 (nmol/min/mg prot)} = [(\Delta A - 0.004) \div 1.274 \times V_{\text{反总}} \times 10^6] \div (V_{\text{样}} \times C_{\text{pr}}) \div T$$

$$= 62.8 \times (\Delta A - 0.004) \div C_{\text{pr}}$$

此法需要自行测定样本蛋白质浓度。

(2) 按样本鲜重计算

单位的定义: 每 g 组织每分钟产生 1 nmol 无机磷定义为一个酶活性单位。

$$\text{复合体 V 活性 (nmol/min /g 鲜重)} = [(\Delta A - 0.004) \div 1.274 \times V_{\text{反总}} \times 10^6] \div (W \times V_{\text{样}} \div V_{\text{样总}}) \div T$$

$$= 50.7 \times (\Delta A - 0.004) \div W$$

(3) 按细菌或细胞密度计算

单位的定义: 每 1 万个细菌或细胞每分钟产生 1 nmol 无机磷定义为一个酶活性单位。

$$\text{复合体 V 活性 (nmol/min /10}^4 \text{ cell)} = [(\Delta A - 0.004) \div 1.274 \times V_{\text{反总}} \times 10^6] \div (500 \times V_{\text{样}} \div V_{\text{样总}}) \div T$$

$$= 0.101 \times (\Delta A - 0.004)$$

V 反总: 反应体系总体积, 3×10^{-4} L; V 样: 加入样本体积, 0.125 mL; V 样总: 加入提取液体积, 0.808 mL; T: 反应时间, 30 min; Cpr: 样本蛋白质浓度, mg/mL; W: 样本质量, g; 500: 细胞或细菌总数, 500 万。